

Sevisana AG

Testo Creme Femina SevisanaLine

SevisanaLine

Ansprechpartner Dr. med. Jürg Eichhorn

Fon +41 (0)71-350 10 20

Adresse Im Lindenhof

E-Mail drje49@gmail.com

Fax +41 (0)71-350 10 21

Bahnhofstr. 23

www.ever.ch

CH-9100 Herisau

Testo Creme Femina SevisanaLine

Testosteron Creme 50ml

Verbraucherinformation**Anwendungsgebiete**

Bei klinisch und labormedizinisch bestätigten Testosteron-Mangelzuständen (siehe Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen).

Eigenschaften (Testosteron allgemein)

Das vorwiegend im Hoden gebildete Androgen Testosteron ist das wichtigste männliche Geschlechtshormon. Es wird von den Hoden und der Nebennierenrinde hergestellt. Testosteron ist verantwortlich für die Entwicklung der meisten körperlichen Charakteristika eines erwachsenen Mannes. Ausserdem beeinflusst es die Sekretion der Hormone LH (luteinisierendes Hormon) und FSH (follikelstimulierendes Hormon), die eine wichtige Rolle bei der Heranreifung der Spermien spielen. Testosteron ist verantwortlich für die Entwicklung der Geschlechtsorgane (Hoden, Spermienbildung, Prostata, Penis) und die typisch männlichen Geschlechtsmerkmale (Behaarung, tiefe Stimme, männliche Fettverteilung). Bei der Frau führt Testosteron zu einer allgemeinen Vermännlichung (Virilisierung) und einem gesteigerten Geschlechtstrieb (Libido). Bei Frauen wird Testosteron von den Eierstöcken und der Nebennierenrinde in geringen Mengen gebildet. Enzymatische Abbauprodukte des Testosterons sind die Hormone Androstendion, Androsteron, Androstandion und Dihydrotestosteron. Letzteres ist wirksamer als Testosteron.

Bei beiden Geschlechtern fördert Testosteron das Knochenwachstums im Wachstumsalter, es vermehrt die Muskelmasse, steigert die Eiweissynthese und senkt den Cholesterinspiegel. Testosteron ist in erster Linie bei genetisch bedingten Testosteron-Mangelzuständen indiziert. Das Hormon wird aber auch bei gewissen Funktionsstörungen therapeutisch angewendet. Im Sport dient Testosteron als Dopingmittel. Ein Testosteronmangel bei der Frau zeigt sich in Form von Libidoverlust, Vergrösserung der Brüste und Zunahme des Bauchfetts. Eher seltene Symptome sind Müdigkeit, Reizbarkeit und Bindegewebsschwäche (Cellulite, Venenerkrankungen).

Inhalt

Grundlage:

Testosteron in DAC Basiscreme

1 mg Testosteron (ca. 0.5 g) entspricht einer Salbenlänge von ca. 2.5 cm.

1 Tube reicht bei 2.5 cm ca. 100 Tage.

Lieferform

Tube à 50 ml

Hergestellt in der Schweiz

Haltbarkeit und Lagerung

Kühl, trocken, für Kinder unerreichbar.

Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.

Wichtige Hinweise

Die Abgabe erfolgt ausschliesslich an Praxispatientinnen.

Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Dosierungsempfehlung

- 1x täglich die Menge von 1 cm / 1.5 cm / 2 cm / **2.5 cm** auf die Haut auftragen, vorzugsweise Ellbeugen-Oberarm seitlich oder/und im Gesicht-Decolleté (wurstförmiger Salbenstrang).
Zieldosis: 2.5 cm maximal!
- **Dosis Reduktion oder Absetzen beim Auftreten von Haut Problemen, z.B. unreine Haut / Akne.**

2.5 cm = 0.5 g Creme = 1 mg Testosteron. 1 Tube reicht bei dieser Dosierung für ca. 100 Tage.

Anwendung morgens tagsüber oder abends

Beginnen Sie stets mit niedrigen Dosen und steigern die Creme Menge bis zur Wohlfühlgrenze!

Unerwünschte Wirkungen (Testosteron allgemein)

Kardiovaskuläre Probleme, Hypertonie, Leberprobleme, Hepatotoxizität, Veränderung von Blutwerten (Blutfette, Erythrozyten, Kalium, Natrium, Kalzium), Prostataprobleme, Wasserretention, Verschlechterung einer Schlaf-Apnoe, Entwicklung einer Polyzythämie oder Gynäkomastie, Mastodynie (schmerzende Brust), Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen, Depressionen, Benommenheit, Amnesie, Parästhesie, Haarausfall, Durchfall, Muskelschmerzen, Priapismus (langandauernde, schmerzhafte Erektion ohne vorgängige sexuelle Stimulation), Leberprobleme (cholestatischer Ikterus).

Anwendungseinschränkung

Bei Patientinnen mit Brustkrebs oder bei Verdacht auf diese Erkrankungen. Bei bekannter Allergie oder Überempfindlichkeit gegenüber einem Wirkstoff oder Zusatzstoff. Jugendlichen unter 18 Jahren darf kein Testosteron verabreicht werden.

Besondere Hinweise / Interaktionen

Orale Antikoagulantien: Verstärkte Wirkung infolge veränderter Synthese der Gerinnungsfaktoren in der Leber. Der INR-Wert (International Normalized Ratio) muss häufiger bestimmt werden. Das Ödemrisiko (Wassereinlagerung) ist erhöht, wenn Testosteron gleichzeitig mit ACTH oder Corticosteroiden angewendet wird. Besondere Vorsicht ist bei Patienten mit Herz-, Nieren- oder Leberleiden geboten.

Alle Patientinnen müssen vor Beginn einer Testosteronbehandlung untersucht werden, um das Risiko eines vorbestehenden Brustkarzinoms auszuschliessen. Während der Testosterontherapie müssen zweimal pro Jahr sorgfältige Kontrollen der Brust (digitale rektale Untersuchung und Überprüfung des PSA-Serumspiegels) durchgeführt werden.

Bei Langzeittherapien müssen Blutbild und Leberwerte regelmässig kontrolliert werden. Epilepsie und Migräne können während einer Testosteronbehandlung verstärkt auftreten. Schlafprobleme und Tagmüdigkeit können auf ein Schlaf-Apnoe Syndrom hinweisen. Eine Überdosierung kann extrem lange oder häufige Erektionen, Reizbarkeit und Gewichtszunahme zur Folge haben. Eine erhöhte Testosteronkonzentration kann bei Frauen zu verstärkter Gesichts- und/oder Körperbehaarung, einer tieferen Stimme und zu Menstruationsunregelmässigkeiten führen. Durch engen Hautkontakt (besonders bei Anwendung im Genitalbereich) kann Testosteron auf den Partner oder die Partnerin übertragen werden. Es wird empfohlen, zwischen der Anwendung von Testosteroncreme und Geschlechtsverkehr einen mehrstündigen Zeitraum einzuhalten.

Schwangerschaft, Stillzeit

Testo Creme Femina SevisanaLine darf in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.