




Traditionelle Chinesische Medizin ASA
 Manuelle Medizin SAMM
 F.X. Mayr-Arzt (Diplom)
 CAS - Genomisch-klinische Medizin
 Wissenschaftliches Doktoratsstudium (UFL)

Sportmedizin SGSM
 Ernährungsheilkunde SSAAMP
 Anti-Aging Medizin SSAAMP
 Thermographie (ThermoMed-ISTT)

Neuraltherapie SANTH & SRN
 Orthomolekularmedizin SSAAMP
 Applied Kinesiology ICAK-D & ICAK-A

Knochendensitometrie - DXA Methode







Bereich	BMD (g/cm ³)	Junge Erw. T-wert	Altersvergl. Z-wert
L1-L4	0.913	-2.2	0.0

Übereinstimmung nach Alter, Gewicht (Frauen 25-100 kg), Ethnische Deutschland (Alter 20-40) AP-Wirbelsäule Referenzbevölkerung (v112)
Laut Statistik sind 68% der Folge-Scans im Bereich von 1SA (± 0.010 g/cm³ für AP-Wirbelsäule L1-L4)



Bild nicht für Diagnosezwecke



Bereich	BMD (g/cm ³)	Junge Erw. T-wert	Altersvergl. Z-wert
Gesamt	0.545	-3.8	-1.7

Übereinstimmung nach Alter, Gewicht (Frauen 25-100 kg), Ethnische Deutschland (Alter 20-40) Femur Referenzbevölkerung (v112)
Laut Statistik sind 68% der Folge-Scans im Bereich von 1SA (± 0.012 g/cm³ für Linker Femur Gesamt)

Bild nicht für Diagnosezwecke



Bereich	BMD (g/cm ³)	Junge Erw. T-wert	Altersvergl. Z-wert
Radius 33%	0.463	-3.4	-0.8

SPA-Kalibrierung wird benutzt: (SPA-Werte liegen 10% niedriger als Comac-Werte.)
Übereinstimmung nach Alter, Ethnischer Deutschland (Alter 20-40) Unterarm Referenzbevölkerung (v112)
Laut Statistik sind 68% der Folge-Scans im Bereich von 1SA (± 0.016 g/cm³ für Linker Unterarm)

Bild nicht für Diagnosezwecke