

| Schema: Darmflora | | | |
|---|---|----------------------------|---|
| Medikament | Dosierung | Tage | |
| Vermox (kassenzulässig) | 2x2 | 3 | Wurmmittel Einnahme unabhängig vom Essen |
| Ampho Moronal Suspension (kassenzulässig) | 4x1 ml Pipette: Markierung beachten | 6 | Darmpilze Ampho Moronal verbleibt im Darm, wird vom Körper nicht aufgenommen Einnahme unabhängig vom Essen |
| Phase 1: Nur Vermox und Ampho Moronal, anschliessend: Phase 2: Nur Creon und Flagyl, anschliessend: Phase 3: Bactoflor und Probiotic für längere Zeit | | | |
| Flagyl 250 (kassenzulässig) | 2x1 | 10 | ev. länger KEIN ALKOHOL (Übelkeit) Einnahme unabhängig vom Essen |
| Creon 25`000 | Je 1x1 ca. 1 Stunde vor der Flagyl Einnahme. Wenn Flagyl fertig, dann Creon weiterhin einnehmen bis Packung aufgebraucht, je 1x1 zum Essen (Hauptmahlzeit). Creon löst die Bakterien-Schutzhülle auf, so dass Flagyl besser angreifen kann. | | |
| Für die Darmflora | | | |
| Reine Flohsamen Schalen | Siehe www.ever.ch : Produkte Info: Memberbereich | | |
| Probiotic | 1x1 abends | Einnahme ev. längerfristig | |